

■普及所から⑨■

灰色かび病に登録された

新規農薬について

現在のところ灰色かび病の発生は少ない傾向となっておりますが、これから多発時期へと向かいますので、十分注意し、適期防除を心がけてください。

今年新しく灰色かび病防除薬剤として、スミブレンド水和剤・ゲッター水和剤が発売されましたので説明します。各剤の適用病害と使用方法については表の通りです。また、使用の際は次の点に気をつけてください。

- ①スミブレンドは多発期に向かう1月中旬ごろから使用する。
- ②約20日間残効があり、防除効果も高いので連続散布はしない。
- ③スミブレンド耐性菌の発生回避のため、スミブレンドを最後に使った後には必ずベンレートかトップジンMを散布する。
- ④石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用は避ける。
- ⑤トマトではスミブレンドを散布すると薬害の恐れがあるのでゲッターを使用する。
- ⑥トマトでゲッターを使用するときは、ベンレ

適用病害と使用方法

商品名	対象作物	適用病害	希釈倍数	使用時期	使用回数
スミブレンド 水和剤	ナス	灰色かび病	1500~2000	収穫前日まで	5回以内
	トマト	灰色かび病	2000		3回以内
	レタス	灰色かび病	1000~2000	収穫7日前まで	5回以内
	インゲンマメ	菌核病	1500	収穫21日前まで	3回以内
	タマネギ	灰色かび病	1000~2000	収穫7日前まで	5回以内
ゲッター 水和剤	トマト	灰色かび病	1000~1500	収穫前日まで	6回以内
		菌核病			
		葉かび病			

①スミブレンドは多発期に向かう1月中旬ごろから使用する。


②約20日間残効があり、防除効果も高いので連続散布はしない。

③スミブレンド耐性菌の発生回避のため、スミブレンドを最後に使った後には必ずベンレートかトップジンMを散布する。

④石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用は避ける。

⑤トマトではスミブレンドを散布すると薬害の恐れがあるのでゲッターを使用する。

⑥トマトでゲッターを使用するときは、ベンレ



ト、トップジンMは使用しない。

この2剤の登録までには7年間もかかっていますので、今後この効果の高い農薬を長い期間使えるように、使用回数、濃度を守り、耕種防除と組み合わせながら効果的に使用してください。

24時間健康

テレホンサービス

高知県保険医療協会では、24時間健康テレホンサービスを行っています。

- ☑電話番号 ③8800
- ☑1月のテーマ
- 月曜日 入れ歯の安定剤
- 火曜日 なかなか治らない咳
- 水曜日 骨粗鬆症について
- 木曜日 妊娠中毒症
- 金曜日 在宅介護支援センターについて
- 土・日曜日 脳卒中の予防

平成2年保険料額

月額	定額		付加保険料	年額
	1月~3月	4月~12月		
定額	8,000円	8,400円	400円	99,600円
定額 + 付加				104,400円
前納	定額	98,370円		
前納	定額 + 付加	103,050円		

納めた保険料が分からない方は、市役所民生課年金係(☎21111内線137)または南国社会保険事務所(☎1111)までお問い合わせください。

【民生課】

おわびと訂正

広報なんこく1月5日号5ページの新生広報委員長紹介の中の「民生児童委員としても活躍」は「上倉南部地区社会福祉協議会長」の誤りでした。おわびして訂正いたします。

国民年金

保険料の確定申告をしましょう

国民年金の保険料は毎月きちんと納めていますか。納め忘れがありますと、後でまとめて納付しなければならず、家計に負担がかかります。部落会や婦人団体などの納付組織に加入したり、口座振替を利用して、納め